


Avertissements agricoles



ISSN 0759-9616

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITÉ
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B. P. 95 - 84140 MONTFAVET

Téléphone (90) 88.21.83

- ARBORICULTURE - CULTURES LEGUMIERES - GRANDES CULTURES -

- N°9 BIS
13 Mai 1985

CEREALES

STADE PHENOLOGIQUE - EPIAISON .

Il s'agit d'un stade important dans la lutte contre les maladies du blé, ce qui suppose une observation de vos parcelles .

SITUATION PHYTOSANITAIRE - SURVEILLENZ LA ROUILLE BRUNE .

A ce jour on peut observer :

ROUILLE BRUNE :

sur variétés sensibles de blé (Mondur) et ponctuellement sur Agathé, Bidi 17, Prinqual .

OIDIUM :

sur les dernières feuilles pour Prinqual, Florence-Aurore .

SEPTORIOSE :

exceptionnellement sur Prinqual (plaine de Pierrelatte) .

Quelques dégâts de *TORDEUSES* .

Dans l'ensemble, la situation phytosanitaire est saine pour la majeure partie des parcelles de blé de notre région, surtout pour les variétés de blé dur : Arcour, Capdur, Creso . Toutefois, une surveillance très attentive des parcelles est nécessaire car le développement de la *ROUILLE BRUNE* est explosif et les dernières pluies ont été favorables à son développement .

LUTTE -

MALADIES

. Observez 40 talles prélevées au hasard par parcelle et reportez-vous à notre tableau de décision .

. N'oubliez pas que si les passages de roues ne sont pas prévus, les dégâts provoqués par le tracteur à l'épiaison sont de l'ordre de 4 à 6 quintaux, ce qui limite la rentabilité économique du traitement .

Liste des produits utilisables :



1 - OIDIUM - ROUILLE - SEPTORIOSE :

CORBEL STAR, IMPACT T SOPRA, BAYFIDAN D, VIGIL T .

2 - OIDIUM - ROUILLE :

CORBEL, IMPACT SOPRA, BAYFIDAN, VIGIL, TILT 125 .

...../.....

STADE DU BLE	OBJECTIF DE RENDEMENT FAIBLE	OBJECTIF DE RENDEMENT ELEVE
 <p>Début épiaison 10.3</p>	<p>- Si <i>Rouille brune</i> sur l'une des trois dernières feuilles, traitez avec 2.</p>	<p>Blé dur (supérieur à 45 q.) Florence-Aurore (supérieur à 40 q.) Prinqual (supérieur à 50 q.)</p> <p>- Si présence de <i>Septoriose</i> traitez avec 1.</p> <p>- Si présence de <i>Rouille brune</i> sur l'une des trois dernières feuilles, traitez avec 1 ou 2</p> <p>- Si aucune maladie, revenez observer dans 10 jours.</p>
 <p>Floraison 10.3 + 10 jours</p>	<p>- Il est trop tard pour traiter.</p>	<p>- Si <i>Rouille brune</i> non contrôlée, traitez avec 2.</p>

TORDEUSES -

Surveillez les parcelles où des dégâts ont été observés l'an passé : épis blancs. Intervenir quand les *TORDEUSES* pincement les feuilles, avant qu'elles ne migrent dans l'épi et essentiellement sur les bordures des champs à proximité des haies.

Matières actives =

deltaméthrine (DECIS CE) : 7,5 g/ha .
cyperméthrine (CYMBUSH, KAFIL super) : 25 g/ha .

MAÏS - TOURNESOL

VERS GRIS - QUELQUES DEGATS OBSERVES .

Dans les parcelles atteintes on observe sur les feuilles de maïs de petits trous circulaires (différents des limaces) occasionnés par les jeunes larves. Intervenir à l'observation de ces dégâts, de préférence le soir, en mouillant abondamment (800 à 1.000 L/ha).

Matières actives

acéphate
cyperméthrine
deltaméthrine
perméthrine

Spécialités commerciales, dose/ha

ORTHENE 50 (1,8 kg)
RIPCORDER (0,6 L), KAFIL Super ou CYMBUSH (0,3 L)
DECIS (0,3 L)
AMBUSH ou PERTHRINE (0,2 L) .